消化器内科・消化器外科

- ◆ PTX (weekly)
- ◆ PTX (triweekly)
- ◆ DTX (triweekly)
- ◆ DTX (triweekly)【アルコールフリー】
- ◆ CPT-11 (weekly)
- ◆ CPT-11 (biweekly)
- ◆ FOLFOX4
- ◆ m-FOLFOX6 (インフューザーポンプ使用)
- ◆ FOLFIRI (インフューザーポンプ使用)
- ◆ FOLFIRI (末梢ルート使用)
- ◆ FOLFOXIRI【プロイメント組込】(インフューザーポンプ使用)
- ◆ 5FU-IV (6投2休)
- ◆ Bev+5FU-IV (6投2休)
- ◆ sLV5FU2 (インフューザーポンプ使用)
- ◆ Bev+sLV5FU2 (インフューザーポンプ使用)
- ◆ Bev+UFT+LV
- ◆ Bev+ロニサーフ
- ◆ C-mab単剤 [初回]
- ◆ C-mab単剤 [2回目以降]
- ◆ C-mab+FOLFOX4 [1コース目]
- ◆ C-mab+FOLFOX4 [2コース目以降]
- ◆ C-mab+m-FOLFOX6 [1コース目] (インフューザーポンプ使用)
- ◆ C-mab+m-FOLFOX6 [2コース目以降] (インフューザーポンプ使用)
- ◆ C-mab+FOLFIRI [1コース目] (インフューザーポンプ使用)
- ◆ C-mab+FOLFIRI [2コース目以降] (インフューザーポンプ使用)
- ◆ C-mab+CPT-11 (weekly) [1コース目]
- ◆ C-mab+CPT-11 (weekly) [2コース目以降]
- ◆ C-mab+CPT-11 (biweekly) [1コース目]
- ◆ C-mab+CPT-11 (biweekly) [2コース目以降]
- ◆ C-mab+Encorafenib+Binimetinib [1コース目]
- ◆ C-mab+Encorafenib+Binimetinib [2コース目以降]
- ◆ P-mab単剤
- ★ P-mab+FOLFOX4
- ◆ P-mab+m-FOLFOX6 (インフューザーポンプ使用)
- ◆ P-mab+FOLFIRI (インフューザーポンプ使用)
- ★ Bev+FOLFOX4
- ◆ Bev+m-FOLFOX6 (インフューザーポンプ使用)
- ◆ Bev+FOLFIRI (インフューザーポンプ使用)
- ◆ Bev+FOLFOXIRI【プロイメント組込】(インフューザーポンプ使用)
- ◆ XELOX★入院導入時は別途クリパス適用
- ◆ Bev+XELOX
- ◆ Cape+Bev
- ◆ IRIS
- ◆ Bev+IRIS (4週サイクル)
- ◆ Bev+IRIS (3週サイクル)
- ◆ Bev+SOX (大腸癌)
- ◆ RAM+FOLFIRI (インフューザーポンプ使用)
- ◆ AF+FOLFIRI (インフューザーポンプ使用)
- ◆ S-1+CDDP [入院用]【day7入院】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ SP+トラスツスマブ [入院用]【プロイメント組込】
- ◆ Cape+CDDP [入院用]【プロイメント組込】
- ◆ SOX (胃癌)
- ◆ アブラキサン単剤 (胃癌)
- ◆ アブラキサン単剤 (weekly) [胃癌]
- ◆ トラスツスマブ (胃癌) [入院用]
- ◆ トラスツスマブ (胃癌) [外来用]
- ★ FLTAX (胃癌) [高用量]
- ★ FLTAX (胃癌) [低用量]
- ◆ Bev+S-1
- ◆ S-1+DTX
- ◆ S-1+DTX【アルコールフリー】
- ◆ S-1+CPT-11
- ◆ S-1+GEM (輸液生食)
- ◆ S-1+GEM (輸液ブドウ糖)
- ◆ CPT-11+CDDP (胃癌)【プロイメント組込】
- ◆ (CPT-11+CDDP)2分割 (胃癌)【プロイメント組込】
- ◆ (CPT-11+CDDP)2分割 (胃癌) (SH) [外来用]【プロイメント組込】
- ★ FP療法 (胃癌) [5-FU+CDDP]
- ◆ RAM+PTX (胃癌)

- ◆ nab-PTX+RAM(胃癌)
- ◆ RAM単剤(胃癌)
- ◆ XELOX(胃癌)
- ◆ m-FOLFOX6(胃癌)(インフューザーホーンで使用)
- ◆ エンハーツ単剤(胃癌)[外来用]
- ◆ GEM単剤(輸液生食)
- ◆ GEM単剤(輸液ブドウ糖)
- ◆ GEM(輸液生食)+タルセバ
- ◆ GEM(輸液ブドウ糖)+タルセバ
- ◆ FOLFIRINOX(膀胱癌)【プロイメント組込】(インフューザーホーンで使用)
- ◆ FOLFIRINOX(膀胱癌)[入院専用]【CVポートなし】【プロイメント組込】
- ◆ modified-FOLFIRINOX(膀胱癌)【プロイメント組込】(インフューザーホーンで使用)
- ◆ modified-FOLFIRINOX(膀胱癌)[入院専用]【CVポートなし】【プロイメント組込】
- ◆ nab-PTX+GEM(輸液生食)
- ◆ nab-PTX+GEM(輸液ブドウ糖)
- ◆ オニバイト+5FU/LV(インフューザーホーンで使用)
- ◆ オニバイト+5FU/LV[入院専用]【CVポートなし】
- ◆ CDDP+GEM[輸液生食](胆管癌)
- ◆ CDDP+GEM[輸液ブドウ糖](胆管癌)
- ◆ CDDP+5-FU(食道癌)【プロイメント組込】
- ◆ NDP(CDGP)+5-FU(食道癌)【高齢者向け】
- ◆ DTX単剤(食道癌)
- ◆ DTX単剤(食道癌)【アルコールフリー】
- ◆ NDP(CDGP)+DTX(食道癌)
- ◆ PTX[6投2休](食道癌)
- ◆ NDP(CDGP)+DTX(食道癌)【アルコールフリー】
- ◆ [中等量]CDDP+5-FU+RT(食道癌)【プロイメント組込】
- ◆ [高用量]CDDP+5-FU+RT(食道癌)【プロイメント組込】
- ◆ RAM単剤(肝細胞癌)
- ◆ アイエーコール
- ◆ テセントリク+Bev(肝細胞癌)[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ テセントリク+Bev(肝細胞癌)[外来導入用]【3週間隔(6週分)】
- ◆ テセントリク+Bev(肝細胞癌)[継続用]【3週間隔(6週分)】
- ◆ インフリキシマブ単剤(クローン病/潰瘍性大腸炎)【5mg/kg】
- ◆ インフリキシマブ単剤(クローン病)【増量用】
- ◆ インフリキシマブ単剤(クローン病/潰瘍性大腸炎)【5mg/kg】【過敏症発現者用】
- ◆ インフリキシマブ単剤(クローン病)【増量用】【過敏症発現者用】
- ◆ エンタヒオ単剤(クローン病/潰瘍性大腸炎)
- ◆ オプジーホ[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オプジーホ[外来導入用]【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーホ[継続用]【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーホ[4週間隔][入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オプジーホ[4週間隔][継続用]
- ◆ オプジーホ[4週間隔][外来導入用]
- ◆ キイトルーダ[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ[継続用]【3週間隔(6週分)】
- ◆ キイトルーダ[6週間隔][入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ[6週間隔][継続用]
- ◆ CDDP+VP-16(NEC、NET)【アプレビタント組込】
- ◆ CDDP+CPT-11(NEC、NET)【アプレビタント組込】
- ◆ CDDP+PEM(腹膜中皮腫)【アプレビタント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液生食)(腹膜中皮腫)(SH)【プロイメント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)(腹膜中皮腫)(SH)【プロイメント組込】

乳腺外科

- ◆ PTX(weekly)
- ◆ PTX(triweekly)
- ◆ DTX(triweekly)
- ◆ DTX(triweekly)【アルコールフリー】
- ◆ FEC60/75/100[入院用]【アプレビタント組込】
- ◆ FEC60/75/100[外来用]【アプレビタント組込】
- ◆ EC[入院用]【アプレビタント組込】
- ◆ EC[外来用]【アプレビタント組込】
- ◆ TC
- ◆ TC【アルコールフリー】
- ◆ CMF[入院用]
- ◆ CMF[外来用]
- ◆ GEM単剤(輸液生食)[乳癌]
- ◆ GEM単剤(輸液ブドウ糖)[乳癌]
- ◆ GEM(輸液生食)+PTX
- ◆ GEM(輸液ブドウ糖)+PTX
- ◆ PTX(weekly)+Bev
- ◆ ハラウエン単剤
- ◆ ロゼウス単剤
- ◆ アブラキサン単剤(乳癌)

- ◆ トラスツスマブ(3週1回)[入院用]
- ◆ トラスツスマブ(3週1回)[外来用]
- ◆ Her+Per+DTX[入院用]
- ◆ Her+Per+DTX[入院用][アルコールフリー]
- ◆ Her+Per+DTX[外来用]
- ◆ Her+Per+DTX[外来用][アルコールフリー]
- ◆ Her+Per[入院用]
- ◆ Her+Per[外来用]
- ◆ かゞサイラ単剤[入院用]
- ◆ かゞサイラ単剤[外来用]
- ◆ エンハーツ単剤[入院用]
- ◆ エンハーツ単剤[外来用]
- ◆ テセントリク+nab-PTX(weekly)[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ テセントリク+nab-PTX(weekly)[外来継続用][4週間隔(4週分)]

呼吸器内科・呼吸器外科

CDDPベース

- ◆ CDDP+DTX【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+DTX【アルコールフリー】【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+DTX(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+DTX(SH)【アルコールフリー】【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+DTX+Bev【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+DTX+Bev【アルコールフリー】【アプレヒタント組込】
- ◆ (CDDP+DTX)[2分割]+TRT【外来不可】【アプレヒタント組込】
- ◆ (CDDP+DTX)[2分割]+TRT【外来不可】【アルコールフリー】【アプレヒタント組込】
- ◆ (CDDP+DTX)[2分割](SH)+TRT【外来不可】【フロイメント組込】
- ◆ (CDDP+DTX)[2分割](SH)+TRT【外来不可】【アルコールフリー】【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+CPT-11【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+CPT-11(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+CPT-11+Bev【外来不可】【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液生食)【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液生食)(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液生食)+Bev【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液生食)+Bev(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)+Bev【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)+Bev(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+VP-16(EP)【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+VP-16(EP)(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+VNR【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+VNR(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+VNR(SH)+TRT【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+PEM【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+PEM(SH)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+PEM+Bev【外来不可】【アプレヒタント組込】
- ◆ CDDP+PEM+Bev(SH)【フロイメント組込】
- ◆ ホートラーザ+CDDP+GEM(輸液生食)【アプレヒタント組込】
- ◆ ホートラーザ+CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)【アプレヒタント組込】
- ◆ ホートラーザ+CDDP+GEM(輸液生食)(SH)【フロイメント組込】
- ◆ ホートラーザ+CDDP+GEM(輸液ブドウ糖)(SH)【フロイメント組込】

CBDCAベース

- ◆ PTX+CBDCA【フロイメント組込】
- ◆ PTX+CBDCA+Bev【フロイメント組込】
- ◆ PTX[3分割]+CBDCA【フロイメント組込】
- ◆ PTX[3分割]+CBDCA+Bev【フロイメント組込】
- ◆ アブラキサン(weekly)+CBDCA【フロイメント組込】
- ◆ アブラキサン(weekly)+CBDCA+Bev【フロイメント組込】
- ◆ weekly(PTX+CBDCA)+TRT【外来不可】
- ◆ 連日低用量CBDCA+TRT
- ◆ CBDCA+DTX【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+DTX【アルコールフリー】【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+CPT-11【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+S-1【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+GEM(輸液生食)【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+GEM(輸液ブドウ糖)【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+GEM(輸液生食)+Bev【外来不可】【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+GEM(輸液ブドウ糖)+Bev【外来不可】【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+VP-16【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+PEM【フロイメント組込】
- ◆ CBDCA+PEM+Bev【フロイメント組込】

併用

- ◆ RAM+DTX
- ◆ RAM+DTX【アルコールフリー】
- ◆ PEM+Bev(メンテナンス)

- ◆ Bev+Erlotinib【入院不可】
- ◆ ADOC(入院専用)【アプレタント組込】

単剤

- ◆ DTX(呼吸器内科・呼吸器外科)
- ◆ DTX(呼吸器内科・呼吸器外科)【アルコールフリー】
- ◆ CPT-11(weekly)
- ◆ アブラキサン(weekly)
- ◆ GEM単剤(輸液ブドウ糖)
- ◆ GEM単剤(輸液生食)
- ◆ VNR単剤
- ◆ PEM【悪性胸膜中脾腫不可】
- ◆ Bev
- ◆ カルセト単剤
- ◆ ハイカムチン単剤
- ◆ ホートラザ単剤(メンテナンス)

ICI(+Chemo)

- ◆ オプジーボ【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オプジーボ【継続用】【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーボ【外来導入用】【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーボ【4週間隔】【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オプジーボ【4週間隔】【継続用】
- ◆ オプジーボ【4週間隔】【外来導入用】
- ◆ オプジーボ+ヤーホイ+CBDC+PEM【入院導入用】(1コース専用)【3週間隔】★別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ オプジーボ+ヤーホイ+CBDC+PEM(2コース専用)【3週間隔】【プロイメント組込】
- ◆ オプジーボ+ヤーホイ+CBDC+PTX【入院導入用】(1コース専用)【3週間隔】★別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ★ オプジーボ+ヤーホイ+CBDC+PTX(2コース専用)【3週間隔】【プロイメント組込】
- ★ オプジーボ【2週間隔】+ヤーホイ【入院導入用】【6週間隔】★導入時は別途クリパス適用
- ★ オプジーボ【2週間隔】+ヤーホイ【継続用】【6週間隔】
- ★ オプジーボ【3週間隔】+ヤーホイ【入院導入用】【6週間隔】★導入時は別途クリパス適用
- ★ オプジーボ【3週間隔】+ヤーホイ【継続用】【6週間隔】
- ◆ キイトルーダ【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ【継続用】【3週間隔(6週分)】
- ◆ キイトルーダ+CDDP+PEM【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【アプレタント組込】
- ◆ キイトルーダ+CDDP+PEM(SH)【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+CDDP+PEM(SH)【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+CBDC+PEM【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+CBDC+PEM【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+PEM【継続用】【3週間隔(6週分)】
- ◆ キイトルーダ+CBDC+PTX【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+CBDC+PTX【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+CBDC+nab-PTX(weekly)【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ+CBDC+nab-PTX(weekly)【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ キイトルーダ【6週間隔】【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ【6週間隔】【継続用】
- ◆ テセントリク【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用
- ◆ テセントリク【継続用】【3週間隔(6週分)】
- ◆ テセントリク+CDDP+PEM【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【アプレタント組込】
- ◆ テセントリク+CDDP+PEM(SH)【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CDDP+PEM(SH)【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CBDC+PEM【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CBDC+PEM【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+PEM【継続用】【3週間隔(6週分)】
- ◆ テセントリク+CBDC+PTX+Bev【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CBDC+PTX+Bev【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+Bev【継続用】【3週間隔(6週分)】
- ◆ テセントリク+CBDC+nab-PTX(weekly)【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CBDC+nab-PTX(weekly)【継続用】【3週間隔(6週分)】【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CBDC+VP-16【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ テセントリク+CBDC+VP-16【継続用】(2-4コース)【3週間隔(9週分)】【プロイメント組込】
- ◆ イミフィンジ【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用
- ◆ イミフィンジ【継続用】【2週間隔(4週分)】(化学放射線療法後非小細胞肺癌)
- ◆ イミフィンジ+CDDP+VP-16【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【アプレタント組込】
- ◆ イミフィンジ+CDDP+VP-16(SH)【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ イミフィンジ+CDDP+VP-16(SH)【継続用】(2-4コース)【3週間隔(9週分)】【プロイメント組込】
- ◆ イミフィンジ+CBDC+VP-16【継続用】(2-4コース)【3週間隔(9週分)】【プロイメント組込】
- ◆ イミフィンジ+CBDC+VP-16【入院導入用】★導入時は別途クリパス適用【プロイメント組込】
- ◆ インフリキシマブ【免疫チェックポイント阻害剤による有害事象用】
- ◆ イミフィンジ【4週間隔】【継続用】(進展型小細胞肺癌)
- ◆ 免疫グロブリン【免疫チェックポイント阻害剤による有害事象用】
- ◆ ミコフェノール酸モフェチル【免疫チェックポイント阻害剤による有害事象用】
- ◆ ピシパニール【胸注用】
- ◆ カルボプラチン【胸注用】
- ◆ アクテムラ単剤【キヤッスルマン病】

- ◆ カルボプラチン【術中散布】
- ◆ エントキサンハルス【間質性肺炎】

血液内科

急性リンパ性白血病(ALL)

- ◆ Hyper-CVAD
- ◆ HD (MTX+Ara-C)
- ◆ DVPAse
- ◆ MTX+L-Asp
- ◆ POMP (Hyper-CVADの維持療法)
- ◆ ヘスポンサ単剤(1コース目)
- ◆ ヘスポンサ単剤[寛解あり](2コース目以降)
- ◆ ヘスポンサ単剤[寛解なし](2コース目以降)
- ◆ ビーリンサイト単剤(1コース目)
- ◆ ビーリンサイト単剤(2コース目or地固め)
- ◆ ビーリンサイト単剤(維持療法)

急性骨髄性白血病(AML)

- ◆ IA (IDR+Ara-C)
- ◆ DA (DNR+Ara-C)[寛解導入療法]
- ◆ DA (DNR+Ara-C)[地固め療法]
- ◆ MA (MIT+Ara-C)
- ◆ AA (ACR+Ara-C)
- ◆ FLAG-MIT
- ◆ FLAG-IDA
- ◆ MEtA
- ◆ High dose Ara-C (HDAC)
- ◆ HAM
- ◆ Ara-C大量+MIT
- ◆ EMA-G
- ◆ マイロターグ
- ◆ マイロターグ[少量分割投与]
- ◆ CAG (Ara-C皮下注)
- ◆ CAG (Ara-C持続)

急性前骨髄球性白血病(APL)

- ◆ ATRA+IA[APL204 寛解導入療法 B群]
- ◆ ATRA+IA[APL204 寛解導入療法 C群]
- ◆ MA (MIT+Ara-C)[APL204 地固め療法C1]
- ◆ DA (DNR+Ara-C)[APL204 地固め療法C2]
- ◆ IA (IDR+Ara-C)[APL204 地固め療法C3]
- ◆ AIDA[APL 寛解導入療法]
- ◆ AIDA[APL 地固め療法 1コース目]
- ◆ AIDA[APL 地固め療法 2コース目]
- ◆ AIDA[APL 地固め療法 3コース目]
- ◆ トリセノックス[APL 寛解導入療法(day1-15)]
- ◆ トリセノックス[APL 寛解導入療法(day16-30)]
- ◆ トリセノックス[APL 寛解導入療法(day31-45)]
- ◆ トリセノックス[APL 寛解導入療法(day46-60)]
- ◆ トリセノックス[APL 寛解後療法(day1-35)]

慢性リンパ性白血病(CLL)

- ◆ マブキャンパス【導入】[入院用]
- ◆ マブキャンパス【増量】[入院用]
- ◆ マブキャンパス【維持】[入院用]
- ◆ マブキャンパス【維持】[外来用]
- ◆ FC[CLL]
- ★ リツキシマブ先発(CLL 1コース目)[入院用](25mL/hr開始)
- ★ リツキシマブ先発(CLL 1コース目)[外来用](25mL/hr開始)
- ★ リツキシマブ先発(CLL 2コース目以降)[入院用](25mL/hr開始)
- ★ リツキシマブ先発(CLL 2コース目以降)[外来用](25mL/hr開始)
- ★ リツキシマブ先発(CLL 2コース目以降)[入院用](100mL/hr開始)
- ★ リツキシマブ先発(CLL 2コース目以降)[外来用](100mL/hr開始)

骨髄異形成症候群(MDS)

- ◆ ビターザ【入院用】(7日連続)
- ◆ ビターザ【外来用】(土日祝は延期)
- ◆ ビターザ【皮下注】[入院用](7日連続)
- ◆ ビターザ【皮下注】[外来用](土日祝は延期)
- ◆ シタレピン皮下注[入院用]

悪性リンパ腫(Lymphoma)

- ◆ Rituximab[入院用](25mL/hr開始)【初回はコチラ】
- ◆ Rituximab[外来用](25mL/hr開始)【初回はコチラ】
- ◆ Rituximab[入院用](100mL/hr開始)
- ◆ Rituximab[外来用](100mL/hr開始)
- ★ Pola-BR(1コース)[入院用]
- ★ Pola-BR(1コース)[外来用]
- ★ Pola-BR(2コース以降)(Rit25mL/hr開始)[入院用]
- ★ Pola-BR(2コース以降)(Rit25mL/hr開始)[外来用]

- ★ Pola-BR(2コース以降)(Rit100mL/hr開始)[入院用]
- ★ Pola-BR(2コース以降)(Rit100mL/hr開始)[外来用]
- ◆ COP[入院用](オンコピン選択)
- ◆ COP[外来用](オンコピン選択)
- ◆ COP[入院用](フィルデシン選択)
- ◆ COP[外来用](フィルデシン選択)
- ◆ CHOP[入院用](オンコピン選択)
- ◆ CHOP[外来用](オンコピン選択)
- ◆ CHOP[入院用](フィルデシン選択)
- ◆ CHOP[外来用](フィルデシン選択)
- ◆ THP-COP[入院用](オンコピン選択)
- ◆ THP-COP[外来用](オンコピン選択)
- ◆ THP-COP[入院用](フィルデシン選択)
- ◆ THP-COP[外来用](フィルデシン選択)
- ◆ ABVD[入院用]
- ◆ ABVD[外来用]
- ◆ GEM-P
- ◆ ESHAP
- ◆ CHASE
- ◆ DeVIC
- ◆ MiCEP
- ◆ Fludarabine
- ◆ EPOCH
- ◆ EPOCH[1ポート]
- ◆ MACOP-B(1)[(1, 2)(5, 6)(9, 10)週]
- ◆ MACOP-B(2)[(3, 4)(7, 8)(11, 12)週]
- ◆ BEACOPP
- ◆ 高用量BEACOPP
- ◆ proMACE-CytaBOM
- ◆ 2-CdA+MIT
- ◆ FCM
- ◆ VIA(Ara-C; day1)
- ◆ VIA(Ara-C; day5)
- ◆ ヘンダムスチン単剤
- ◆ ヘンダムスチン併用(90mg/gm2)【リツキシマブ・ガザイハ併用時はコチラ】
- ◆ VCAP(ATL)[LSG15 プロトコルA]
- ◆ AMP(ATL)[LSG15 プロトコルB]
- ◆ VECF(ATL)[LSG15 プロトコルC]
- ◆ Mogamulizumab単剤[入院用]
- ◆ Mogamulizumab単剤[外来用]
- ◆ アトセトリス単剤[体重90kg未満]
- ◆ A+AVD[体重40kg未満]
- ◆ A+AVD[体重40kg以上]
- ◆ オブジーホ[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オブジーホ[継続用]【2週間隔(4週分)】
- ◆ オブジーホ【4週間隔】[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オブジーホ【4週間隔】[継続用]
- ◆ オブジーホ【4週間隔】[外来導入用]
- ◆ キイトルーダ[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ[継続用]【3週間隔(6週分)】
- ◆ キイトルーダ【6週間隔】[入院導入用]★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ【6週間隔】[継続用]
- ◆ Obinutuzumab[CHOP併用](1コース目)【3週間隔】
- ◆ Obinutuzumab[CHOP併用](2-6コース)【3週間隔】
- ◆ Obinutuzumab[トリアキシン併用](1コース目)【4週間隔】
- ◆ Obinutuzumab[トリアキシン併用](2-6コース)【4週間隔】
- ◆ Obinutuzumab[単剤維持療法]
- ◆ GB[ガザイハ, トリアキシンday1同日投与](1コース目)
- ◆ GB[ガザイハ, トリアキシンday1同日投与](2-6コース)
- ◆ V(R)-CAP(Rit別処方)[入院用](マンツル細胞リンパ腫)
- ◆ V(R)-CAP(Rit別処方)[外来用](マンツル細胞リンパ腫)
- ◆ プラトレキサート単剤(末梢性T細胞リンパ腫)
- ◆ ロミデプシン単剤(末梢性T細胞リンパ腫)
- ◆ A+CHP[体重90kg未満][入院用](末梢性T細胞リンパ腫)
- ◆ A+CHP[体重90kg未満][外来用](末梢性T細胞リンパ腫)
- ◆ A+CHP[体重90kg以上][入院用](末梢性T細胞リンパ腫)
- ◆ リツキシマブ先発[外来用](25mL/hr開始)【初回はコチラ】
- ◆ A+CHP[体重90kg以上][外来用](末梢性T細胞リンパ腫)
- ◆ リツキシマブ先発[入院用](25mL/hr開始)【初回はコチラ】
- ◆ リツキシマブ先発[入院用](100mL/hr開始)
- ◆ リツキシマブ先発[外来用](100mL/hr開始)
- ◆ DMVM+INF- α (HLBI)
- ◆ VCR+L-Asp+PSL[NK細胞リンパ腫]
- ◆ MTX大量

- ◆ ロイスタチン
- 多発性骨髄腫(MM)
- ◆ VAD
- ◆ Hyper-CVAD(myeloma)
- ◆ DCEP(myeloma)
- ◆ ヘルケイト[®](DEX点滴併用)
- ◆ ヘルケイト[®](DEX内服併用-レナテックス院外処方)
- ★ ヘルケイト【週1回投与】(DEX点滴併用)
- ★ ヘルケイト【週1回投与】(DEX内服併用)
- ◆ VMP(1-4コース)
- ◆ VMP(5-9コース)
- ◆ VDC(最大8コース)
- ◆ VDC(維持療法 4コース)
- ◆ PAD
- ◆ VRd(DEX点滴併用)
- ◆ VRd(DEX内服併用)
- ◆ VRd【週1回投与】(DEX点滴併用)
- ◆ VRd【週1回投与】(DEX内服併用)
- ◆ VPd(1-8コース)
- ◆ VPd(9コース以降)
- ◆ KRd(1コース)
- ◆ KRd(2-12コース)
- ◆ Kd(1コース)【週2回投与】[入院用]
- ◆ KRd(13-18コース)
- ◆ Kd(1コース)【週2回投与】[外来用]
- ◆ Kd(2コース以降)【週2回投与】[入院用]
- ◆ Kd(2コース以降)【週2回投与】[外来用]
- ◆ Kd(1コース)【週1回投与】[入院用]
- ◆ Kd(1コース)【週1回投与】[外来用]
- ◆ Kd(2コース以降)【週1回投与】[入院用]
- ◆ Kd(2コース以降)【週1回投与】[外来用]
- ◆ ELd(1, 2コース)[入院用]
- ◆ ELd(1, 2コース)[外来用]
- ◆ ELd(3コース以降)[入院用]
- ◆ ELd(3コース以降)[外来用]
- ◆ EPd(1, 2コース)[外来用]
- ◆ EPd(3コース以降)[外来用]
- ◆ DLd(1コース)1コース毎【入院導入】
- ◆ DLd(2コース)1コース毎
- ◆ DLd(3-6コース)1コース毎
- ◆ DLd(7コース以降)1コース毎
- ★ DLd[未治療](1コース)1コース毎【入院導入】
- ★ DLd[未治療](2コース)1コース毎
- ★ DLd[未治療](3-6コース)1コース毎
- ★ DLd[未治療](7コース以降)1コース毎
- ◆ DLd【タラキューロ】[再発・難治](1コース)1コース毎[入院用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](1コース)1コース毎[外来用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](2コース)1コース毎[入院用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](2コース)1コース毎[外来用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](3-6コース)1コース毎[入院用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](3-6コース)1コース毎[外来用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](7コース以降)1コース毎[入院用]
- ★ DLd【タラキューロ】[再発・難治](7コース以降)1コース毎[外来用]
- ◆ DBd(1コース)1コース毎【入院導入】
- ◆ DBd(2, 3コース)1コース毎
- ◆ DBd(4-8コース)1コース毎
- ◆ DBd(9コース以降)1コース毎
- ★ DBd【タラキューロ】(1コース)1コース毎[入院用]
- ★ DBd【タラキューロ】(1コース)1コース毎[外来用]
- ★ DBd【~~3~~3コース]1コース毎[入院用]
- ★ DBd【~~3~~3コース]1コース毎[外来用]
- ★ DKd(1コース)1コース毎【入院導入】
- ★ DKd(1コース)1コース毎【外来導入】
- ★ DKd(2コース)1コース毎
- ★ DKd(3-6コース)1コース毎[入院用]
- ★ DKd(3-6コース)1コース毎[外来用]
- ★ DKd(7コース以降)1コース毎[入院用]
- ★ DKd(7コース以降)1コース毎[外来用]
- ★ DKd【タラキューロ】(1コース)1コース毎[入院用]
- ★ DKd【タラキューロ】(1コース)1コース毎[外来用]
- ★ DKd【タラキューロ】(2コース)1コース毎[入院用]
- ★ DKd【タラキューロ】(2コース)1コース毎[外来用]
- ◆ DMPB(1コース)1コース毎【入院導入】
- ◆ DMPB(2-9コース)1コース毎

- ◆ DMPB(10コース以降)1コース毎
 - ★ DMPB【タラキユーロ】(1コース)1コース毎〔外来用〕
 - ★ DMPB【タラキユーロ】(2-9コース)1コース毎〔外来用〕
 - ◆ IsaPd(1コース)〔入院用〕
 - ◆ IsaPd(1コース)〔外来用〕
 - ★ IsaPd(2コース以降)〔入院用〕
 - ★ IsaPd(2コース以降)〔外来用〕
 - ◆ Panobinostat+Vd(1-8コース)
 - ◆ Panobinostat+Vd(9-16コース)
 - ◆ Triple IT【髄注】〔MTX: 10mg, Ara-C: 40mg固定用量〕
 - ◆ Triple IT【髄注】〔MTX, Ara-C用量調節用〕
- 移植レジメン
- ◆ BU+CY
 - ◆ Flu+BU
 - ◆ Flu+BU【臍帯血移植】
 - ◆ DCEC
 - ◆ Flu+Ara-C+L-PAM【HAPLO】
 - ★ Flu+L-PAM【HAPLO-RIST】
 - ◆ Flu+L-PAM+TBI【臍帯血移植】
 - ◆ Flu+L-PAM(Flu: day-6~-2)【Allo-HCT】
 - ◆ BU+L-PAM
 - ◆ TBI+Ara-C+CY
 - ★ TBI+CY+VP-16
 - ★ Flu+BU+L-PAM(BU: day-7~-4)【CBT】
 - ★ Flu+BU+L-PAM(BU: day-6, -5)【CBT】
 - ★ Flu+BU+L-PAM(BU: day-6~-4)【PBSCT】
 - ★ Flu+BU[1回/日]+L-PAM(BU: day-7~-4)【CBT】
 - ★ BuCyE
 - ◆ Flu+CY+ATG
 - ◆ MEAM-ASCT【自家移植】
 - ◆ アルケラン大量
 - ◆ MTX【15-10-10mg/m²】(GVHD予防)
 - ◆ MTX【10-7-7mg/m²】(GVHD予防)
 - ◆ PT-Cy【day3, 4】(GVHD予防)
 - ◆ インフリキシマブ(ハプロ移植時難治性急性GVHD治療)
 - ◆ テムセル単剤【症例単位で四役会議の許可が必要】
 - ◆ テムセル単剤〔追加投与専用〕

泌尿器科

- ◆ DTX(weekly)〔5投1休〕
- ◆ DTX(weekly)〔5投1休〕【アルコールフリー】
- ◆ DTX(biweekly)
- ◆ DTX(biweekly)【アルコールフリー】
- ◆ DTX(triweekly)
- ◆ DTX(triweekly)【アルコールフリー】
- ◆ ジェブタナ単剤
- ◆ GC(輸液生食)【アプレピタント組込】
- ◆ GC(輸液ブドウ糖)【アプレピタント組込】
- ◆ G(輸液生食)-CBDCA【フロイメント組込】
- ◆ G(輸液ブドウ糖)-CBDCA【フロイメント組込】
- ◆ GEM単剤(輸液生食)
- ◆ GEM単剤(輸液ブドウ糖)
- ◆ BEP(精巣癌)【フロイメント組込】
- ◆ MEC【アプレピタント組込】
- ◆ M-VAC(エピルピシチン選択)
- ◆ M-VAC(テラルピシチン選択)
- ◆ マイトマイシン膀胱注
- ◆ トーレルセル単剤
- ◆ CBDCA(adjutant)【フロイメント組込】
- ◆ CDDP+VP-16(膀胱癌)【アプレピタント組込】
- ◆ CBDCA+VP-16(膀胱癌)【アプレピタント組込】
- ◆ オプジーホ〔入院導入用〕★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オプジーホ〔継続用〕【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーホ〔外来導入用〕【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーホ【4週間隔】〔入院導入用〕★導入時は別途クリパス適用
- ◆ オプジーホ【4週間隔】〔継続用〕
- ◆ オプジーホ【4週間隔】〔外来導入用〕
- ◆ キイトルーダ〔入院導入用〕★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ〔継続用〕【3週間隔(6週分)】
- ◆ キイトルーダ【6週間隔】〔入院導入用〕★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ【6週間隔】〔継続用〕
- ◆ キイトルーダ+インライタ〔入院導入用〕★導入時は別途クリパス適用
- ◆ キイトルーダ+インライタ〔外来継続用〕【3週間隔(6週分)】
- ◆ ハベンチオ+インライタ〔入院導入用〕★導入時は別途クリパス適用
- ◆ ハベンチオ+インライタ〔外来継続用〕【2週間隔(4週分)】

- ◆ パベンチオ単剤(尿路上皮癌、維持療法)[入院導入用]★導入時は別途クリハス適用
- ◆ パベンチオ単剤(尿路上皮癌、維持療法)[外来継続用]【2週間隔(4週分)】
- ◆ オプジーボ+ヤーホイ[入院導入用]★導入時は別途クリハス適用
- ◆ オプジーボ+ヤーホイ[外来継続用](2-4コース)【3週間隔(9週分)】

産婦人科

- ◆ TC(PTX+CBDCA)(3週1回)[入院用]【アプレヒタント組込】
- ◆ TC(PTX+CBDCA)(3週1回)[外来用]【アプレヒタント組込】
- ◆ TC(PTX+CBDCA)(3分割)[入院用]【アプレヒタント組込】
- ◆ TC(PTX+CBDCA)(3分割)[外来用]【アプレヒタント組込】
- ◆ PTX+CBDCA+Bev[入院用]【アプレヒタント組込】
- ◆ PTX+CBDCA+Bev[外来用]【アプレヒタント組込】
- ◆ CBDCA+GEM(輸液生食)+Bev
- ◆ CBDCA+GEM(輸液ブドウ糖)+Bev
- ◆ DTX+CBDCA(3週1回)
- ◆ DTX+CBDCA(3週1回)【アルコールフリー】
- ◆ PTX(weekly)+Bev
- ◆ CDDP+CPT-11[入院用]【アプレヒタント組込】
- ◆ Bev単剤(卵巣癌維持療法)
- ◆ AP[入院用]【アプレヒタント組込】
- ◆ BEP(卵巣癌)
- ◆ GEM単剤(輸液生食)
- ◆ GEM単剤(輸液ブドウ糖)
- ◆ トキシル単剤
- ◆ トキシル+CBDCA

皮膚科

- ◆ インフリキシマブ単剤(乾癬)【5mg/kg】
- ◆ インフリキシマブ単剤(乾癬)【増量用】
- ◆ インフリキシマブ単剤(乾癬)【5mg/kg】【過敏症発現者用】
- ◆ インフリキシマブ単剤(乾癬)【増量用】【過敏症発現者用】
- ◆ CPT-11(有棘細胞癌)

整形外科

- ◆ インフリキシマブ(関節リウマチ)【3mg/kg】
- ◆ インフリキシマブ(関節リウマチ)【増量用】
- ◆ インフリキシマブ(関節リウマチ)【3mg/kg】【過敏症発現者用】
- ◆ インフリキシマブ(関節リウマチ)【増量用】【過敏症発現者用】
- ◆ アクテムラ(関節リウマチ)
- ◆ オレンシア(関節リウマチ)

全科共通

- ◆ キイトルーダ[®](MSI-High)[入院導入用]★導入時は別途クリハス適用
- ◆ キイトルーダ[®](MSI-High)[継続用]【3週間隔(6週分)】
- ◆ キイトルーダ[®](MSI-High)【6週間隔】[入院導入用]★導入時は別途クリハス適用
- ◆ キイトルーダ[®](MSI-High)【6週間隔】[継続用]