




シムジア 皮下注射

<h2>効果</h2>	<p>皮下に注射する薬で痛みや腫れなどの症状が改善します。関節破壊に対しても抑制効果も認められています。</p>  
<h2>投与方法</h2>	<p>症状に応じた投与方法を選べます。 初月に倍量投与 0・2・4週に皮下注射したり、 基本、2週間毎に1回200mg、皮下注射いたします。 症状が安定すれば、4週毎に1回400mg、皮下注射も可能です。 主治医や看護師との十分な相談と注射のトレーニングを受けることで自己注射を行うことができます。</p>  <p>シリンジ (拡大画像)</p>
<h2>主な副作用</h2>	<p>【投与部位反応】 注射した部分にかゆみや腫れ、痛み、赤くなったりすることがあります。</p> <p>【感染症】 免疫機能を低下させ、感染症を引き起こすことがあります。発熱、咳、倦怠感、食欲不振など体調に異常を感じたら連絡してください。</p>
<h2>費用</h2>	<p>3割負担の方：通常、外来投与の日は約2万3千円の自己負担となります。 1割負担の方：通常、外来投与の日は約8千円の自己負担となります。 初回より、ローディングをすると上記の倍額（用量・投与方法により異なります） 自己注射する事で高額療養費が適応する場合があります。 高額療養費は保険の種類や所得により異なります。</p>